


異なるワクチンの接種間隔


注射生ワクチン	
定期	BCG、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘
任意	おたふくかぜ、黄熱、天然痘（エムボックス予防）



注射生ワクチン

- ※1 4週間後の同じ曜日から接種できます。
- ※2 同一のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔で接種してください。
（例：ロタウイルスワクチンの場合、他のワクチンとの接種間隔の制限はありませんが、ロタウイルスワクチンの各回の間隔は27日以上必要です。）

経口または経鼻生ワクチン	
定期	ロタウイルス感染症
任意	経鼻弱毒生インフルエンザ



注射生ワクチン

経口または経鼻生ワクチン

不活化ワクチン等

不活化ワクチン・トキソイド・mRNAワクチン	
定期	B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、五種混合、四種混合、三種混合、二種混合(DT)、ポリオ、日本脳炎、HPV、RSウイルス感染症
任意	インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A型肝炎、狂犬病、破傷風、髄膜炎菌感染症、ダニ媒介脳炎、腸チフス

《注意事項》

- 接種から数日間は、発熱や接種部位のはれ等の症状が出ることがあります。規定上接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位のはれがないこと等、体調に問題がないことを確認してから、接種してください。
- 特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。
- 新型コロナウイルスワクチンは、注射生ワクチン以外のワクチンと同様、他のワクチンと、接種間隔の規定をおかず、医師が必要と認めた場合は同時接種も行うことができます。
- RSウイルス感染症ワクチンは、海外の知見で、百日咳菌の防御抗原を含むワクチンとの同時接種で、百日咳菌の防御抗原に対する免疫応答が低下するとの報告があり、接種間隔等については接種医と相談してください。
- その他のワクチンの接種間隔については、接種医にご確認ください。